



QUETION ZINC FLOW

QUETION ZINC FLOW fertilizante foliar y corrector nutricional 100% soluble, formulado en base a zinc de alta concentración, lo que permite una mayor disponibilidad y rápida absorción por parte de la planta.

APLICACIÓN
FOLIAR



INGREDIENTE
ACTIVO

Zinc



FORMULACIÓN

Concentrado
Soluble (SL)



ELEMENTO

Zinc



CONCENTRACIÓN

70 % p/v (700 g/Kg)



COMAGRO

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis (cc/100 L)	Dosis (L/ha)	Observaciones
Uva de mesa	50 - 100	0,5 - 1,5	Realizar dos aplicaciones, en pre-flor e inicios de floración.
Cítricos	100 - 200		Realizar dos aplicaciones, la primera en primavera y la segunda en otoño.
Almendra Cerezo Damasco Duraznos Nectarin	30 - 50		Aplicar con brotes de 5-10 cm, repitiendo cada 10 días. Aplicar en post-cosecha, 30 días antes del inicio de caída de hojas.
Ciruelo	30 - 40		Aplicar con brotes de 5-10 cm, repitiendo cada 10 días.
	70		Aplicar en post-cosecha, 30 días antes de caída de hojas.
Nogal	30 -60		Aplicar con la aparición de amentos masculinos y flores pistiladas receptivas.
Frambuesa, Arándanos Frutillas, Mora	100		Aplicar 1-2 veces, preferentemente en pre-floración.

METALES PESADOS		
Plomo (Pb)	<3,65 ppm	
Arsenico (As)	<2,0 ppm	
Cadmio (Cd)	<0,5 ppm	
Mercurio (Hg)	<0,2 ppm	

pH	8,50
Densidad	1,70-1,80 a 20°C
Solubilidad	>200 g/L a 20°C

Recomendaciones de aplicación foliar en cultivos extensivos		
Cultivo	Dosis L/ha	Momento de Aplicación
Cereales	0,5 a 1,0	Pleno macollaje, segunda aplicación en espiga embuchada.
Maiz	1,0 a 2,0	Estado vegetativo V4 - V6.
Soja-mani	0,4 a 1,0	Estado vegetativo V4 - V6-Segunda aplicación en RL.
Arroz	1,0 a 1,5	Pleno macollaje, segunda aplicación en espiga embuchada.

Recomendaciones de tratamiento de semillas		
Cultivo	Dosis L/ha	Momento de Aplicación
Cereales	0,1 a 0,2	En tratamiento de semillas junto con curasemillas.
Maiz	0,1 a 0,2	En tratamiento de semillas junto con curasemillas.
Arroz	0,1 a 0,2	En tratamiento de semillas junto con curasemillas.



PRECAUCIONES

- Fertilizante de baja toxicidad, se sugiere usar medidas de protección propias de un fitosanitario.
- Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.
- Mantener el envase cerrado mientras no esta siendo usado.
- No almacenar en temperaturas de congelamiento ni temperaturas superiores a 43°C.
- Inutilizar los envases de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes.
- No trasportar ni almacenar con alimentos, no lavar envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua, guardar en lugar fresco y seco.
- Considerar un buen volumen de agua para mojar todo el follaje. Puede ser aplicado con equipos electrostáticos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

Sin restricciones

QUETION ZINC FLOW es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala para observar los aspectos físicos de la mezcla.



PRESENTACIÓN



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO

Importado y distribuido por Comagro SPA.
 contacto@comagrochile.cl
 www.comagrochile.cl
 Fabricado por Uvio R&D, España.



